Lora Común

Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788).

Yellow-crowned Amazon, Lora cabeciamarilla, lora copete amarillo, Amazona real

El depredador natural de la Lora común es la *Boa constrictor*, ésta logra alimentarse de los polluelos o hembras que suelen frecuentar los nidos.[1]

SABÍAS QUE...

Cuando las loras son unos pichones son ciegas y permanecen en sus nidos bajo el cuidado parental durante mucho tiempo. [3]

"Continúa leyendo para descubrir más datos interesantes sobre ellos"


DISTRIBUCIÓN

Ésta ave se encuentra en un amplio territorio que comprende desde México hasta Chile, principalmente en bosques tropicales húmedos y secos. En Colombia se encuentra en diferentes regiones, desde el Caribe hasta la Amazonía, en alturas no superiores a los 1.500 msnm,[2] principalmente en bosques secos abiertos, bosques húmedos y sabanas con árboles dispersos.[3]



CARACTERÍSTICAS

- Es considerada como la lora más común del grupo de los psitácidos.
- El tamaño de su cuerpo está entre 35 - 38 centímetros aproximadamente.
- La mayor parte de su cuerpo es verde. Al alcanzar la adultez, justo encima de la cabeza tiene una coloración amarilla, en sus alas y hombros se pueden notar tonalidades rojizas, mientras la punta de la cola corta es amarilla. [4y5] Las tonalidades en individuos más jóvenes son más opacas.



COMPORTAMIENTO

- Estas aves anidan a una altura baja del árbol buscando troncos huecos de árboles o palmas, pueden llegar a colocar 2 ó 3 huevos.[1]
- La incubación es hecha por la hembra y tiene un tiempo estimado de 25 y 29 días. Durante este tiempo el macho alimenta a la hembra y ésta pocas veces sale del nido.[1y3]
- Generalmente vuelan en pareja. En algunos casos se unen a bandadas de la misma especie que pueden agregar hasta 200 individuos.




Andre Engels 2004

ALIMENTACIÓN

- Su pico es corto y curvo hacia abajo. Con él tiene la habilidad de romper frutos y semillas.[2]
- La mayoría de estas aves buscan sus alimentos en la parte alta o media de los bosques en los que se encuentran. Su dieta se basa de frutos, flores y semillas.[6]

SABÍAS QUE...

NO, LOS LOROS NO HABLAN,
pero tienen la capacidad de imitar o repetir sonidos escuchados gracias a una estructura cerebral adicional a su siringe, un órgano que les permite imitar con precisión.



CATEGORÍAS DE LA LISTA ROJA UICN

Según la lista roja de la UICN, la lora común se encuentra en la catalogada en **preocupación menor.**

UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Autoridad mundial sobre el estado del mundo natural, elabora anualmente un listado de animales y plantas en riesgo de extinción. (Red list) con el fin de alertar y promover acciones para salvaguardarlos.


NO EVALUADA	DATOS INSUFICIENTES	PREOCUPACIÓN MENOR	CASI AMENAZADO	VULNERABLE	EN PELIGRO	PELIGRO CRÍTICO	EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE	EXTINTA
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La lora común tiene una distribución bastante amplia, razón por la cual se encuentra en la categoría de preocupación menor. Sin embargo, la población de esta especie está disminuyendo en niveles locales y regionales, por eso se podría llegar a una extinción local principalmente por la captura ilegal para tenencia como mascotas.[7y10]

SABÍAS QUE...

Las loras se exhiben durante el cortejo, es decir que, para llamar la atención del macho, hace movimientos de alas, reverencias, alas caídas, meneos de cola, levantamientos de pies, entre otros.[1]



Humming for change

WWF FOR YOUR WORLD

OpEPA

AMENAZAS

- En Colombia las aves más traficadas pertenecen a la familia de los Psittacidae, siendo la lora común la especie más utilizada como ave de jaula o de compañía, principalmente por su comportamiento sociable y por sus colores llamativos.[8]
- La pérdida de su hábitat por deforestación es una de las razones por las cuales también se ven afectadas sus poblaciones.

SABÍAS QUE...

En las cifras que comparten de las autoridades ambientales, la gran mayoría coinciden en que el casi 80% de los decomisos por tráfico ilegal de fauna silvestre corresponde a las aves, en su mayoría los psitácidos, dentro de los cuales se pueden encontrar: Periquito bronceado, *Brotogeris jugularis; Cotorra cheja, Pionus menstruus.*[10]

SABÍAS QUE...

En el nombre científico de esta especie de ave, Amazona ochorocephala, el término Amazona hace referencia a la Amazonía, mientras que Ochrocephala se deriva de Okhros que significa Amarillo pálido y kephale que significa cabeza. Es decir, Lora de la Amazonía con cabeza Amarilla.[9]



Jacques Barraband 1805

NIVEL DE TRÁFICO ILÍCITO

LOCAL	NACIONAL	INTERNACIONAL
✓	✓	

[1]Brittain, M. 2007. "Amazona ochrocephala" (On-line), Animal Diversity Web. Accessed April 27, 2013 at http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Amazona_ochrocephala.html
[2]Ayerbe, F. (2018). Guía Ilustrada de la Avifauna colombiana. Bogotá, Colombia: Puntoaparte
[3]Hilty, S & Brown, W. L. (1986). A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press
[4]Aguilar, H.,(2001), - Algunas notas sobre el Loro Real Amazona Ochrocephala (Gmalin) (Psitacidae: Psittacinae: ARINI) En Venezuela Rev. Ecol. Lat. Am. 8 (1); 17-39
[5]McMullan, M. & Reyes Londoño, J.J.(2021). Guía de campo de las Aves en Colombia. Mc Mullan Birding Publishers. Cali, Valle del Cauca.
[6]Cerrejón 2010. Monitoreo de Fauna en el Valle del Cerrejón. p. 417
[7]IUCN. (2018). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. Available at: www.iucnredlist.org. .
[8]Hoyos L. Correa M, Franco M y Ramirez-Benavides GF. (2010). Hallazgos hematológicos y química sanguínea en Amazona amazonica y Amazona ochrocephala cautivas en la reserva forestal Torre Cuatro. Boletín Científico Centro de Museos, Museo de Historia Natural, vol. 1 3, nº 2, pp. 63-77.
[9]Jobling, C. 2010. The Helm dictionary of cientifics birds names. Christopher Helm and A & C Black Publishers Ltda. Londres.
[10]Baptiste E.,M.P., Vargas - Tovar, N., Osorno M. Cardenas Lopez, D y gonzales, M (2014). Trafico ilegal de especies: En: Bello et al. (Ed) Biodiversidad.Estado y tendencias de la biodiversidad continental en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá D.C., Colombia
Engels, A. (2004) Parrot (Amazona ochrocephala) eating watermelon [fotografía] recuperado de https://eol.org/media/8088271
Barraband, J. (1805) Histoire naturelle des perroquets L' Amazone femelee P. 85 - Amazona ochrocephala[fotografía] recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Histoire_naturelle_des_perroquets_(9949504733).jpg

Humming for change

WWF FOR YOUR WORLD

OpEPA